



따뜻한 만남으로 행복을 나누세요!

동국대학교일산병원 News Letter

01 건강한 사회, 여러분과 함께 만들어 갑니다.

동국대학교의료원은 사회로부터 받은 사랑을 지역사회에 되돌려 주는 '건강한 사회 만들기' 첫 번째 사업으로 2명의 환우에게 무료수술을 시행했다.

지금까지 100여 차례 이상 의료봉사를 시행하면서 의료사각지대에 있는 어려운 이웃에 대한 치료 필요성이 공감되었고, 동국대학교의료원의 규정개정과 후원금 모집에 대한 구체적인 활동은 사회 공헌활동에 탄력을 더했다.

대상자는 본원의 취지와 기부자의 뜻에 어긋나지 않도록 전국 불교계 장애인시설을 방문하고 봉사활동을 했던 차트를 되짚어 보면서 선발했다.

앞으로 경제적으로 어려운 이웃을 위한 '자비나눔후원금'과 수행에 전념하느라 건강을 챙기지 못한 스님을 위한 '승가의료후원금'을 활성화하여 경제적인 이유로 치료를 받지 못하는 이들이 없도록 적극적인 활동을 전개하고, 더 나아가 이웃에게 감동을 주는 병원이 되도록 최선을 다 할 계획이다.



02 동국대학교일산병원 의료공간정비위원회 열려

동국대학교일산병원은 4일 공간정비위원회보고회를 열었다.

이날 공간정비 위원회에서는 △정서적 환경의 고품격화 △안전하고 깨끗한 환경조성 △첨단의료시스템을 갖춘 병원 △미래의 성장과 변화에 대응하는 병원 등의 구체적 실행전략 수립을 위한 세부계획을 밝혔다.

공간정비 위원회는 의료서비스 패러다임 전환에 따른 의료공간을 정비하여 장기적 변화에 대비하고, 병원의 지속적 성장을 지원할 수 있는 공간의 종합계획을 수립하고자 지난 2015년 하반기부터 활동을 시작했다. 공간정비 사업은 단기추진과 중장기 추진으로 나누어 진행할 예정이다.

단기추진 사업으로는 로비, 외래진료공간, 접수수납창구, 휴식공간, 첨단디지털보드 등을 개선하여 환자눈높이에 맞춘 환자중심의 공간정비 사업을 진행한다. 또한, 중장기 사업은 병원 성장에 발 맞추어 신축과 증축 계획을 수립하여 진행하고 있다.

이번 의료공간 정비가 완료되면 환자에 대한 배려와 효과적인 치유공간이 조성되어 진료의 질을 한 단계 더 도약시킬 것으로 기대하고 있다.



03 주사침자상 사고예방 캠페인

동국대학교일산병원에서는 4일 감염관리실 주관으로 '주사침자상 사고예방'캠페인을 개최했다. 의료인의 감염사고 중 가장 대표적인 사례가 주사나 카테터 등에 찔리는 자상사고이다.

이러한 자상사고를 예방하기 위해서 본원에서는 안전주사침을 2006년도 도입했지만 사용률이 미비했다.

안전주사침 사용 대상은 B형 간염, C형 간염, AIDS, 매독이 있으며 안전 주사침 사용을 통해 혈액매개질환과 주사침 자상사고에 따르는 안전사고를 예방할 수 있다.

이날 행사에서는 안전주사침을 직접 사용해보고 안전 메시지를 담은 사진 촬영을 하는 등 감염관리 활동을 직접 체험할 수 있도록 꾸며 직원의 안전을 적극적으로 실천할 수 있는 소중한 시간이 되었다.



Smart Tip

지카바이러스 행동 수칙

최근 중남미 지역에서 지카바이러스 감염증이 유행하고 있어 해당지역 여행객들의 주의를 당부하며 행동수칙을 내놓았다.

1. 2개월 이내에 모기가 많은 열대 및 아열대 지역 국가를 여행할 경우

- 질병관리본부 홈페이지에서 지카 바이러스 발생 국가 여부 확인
- 모기 퇴치 제품, 밝은색 긴팔 긴바지를 준비
- 방충망 있고 냉방이 잘되는 숙소 이용
- 귀국 이내 발열, 발진, 관절통, 근육통, 결막염, 두통 발생하면 병원 방문
- 귀국 후 1개월 동안 헌혈 금지
- 남성은 귀국 후 2개월 동안 피임기구 사용

2. 임산부 행동수칙

- 2개월 이내 지카 바이러스 발생한 국가로의 여행 자제
- 여행이 불가피할 경우 출발 전 의료진 상담 요망
- 일반 모기 기피제는 임신부도 사용 가능
- 귀국 후 3, 4주에 한번 태아 초음파 검사 실시

3. 지카바이러스 감염 의심된다면

- 의료기관을 즉시 방문해 진료 검사를 진행
- 지카바이러스에 감염돼도 충분한 휴식을 통해 1주일 안에 회복됨.
- 귀국 후 3, 4주에 한번 태아 초음파 검사 실시(80%는 증상이 아예 없는 경우도 있음)
- 일상 접촉으로 감염되지 않기 때문에 격리치료 받지 않아도 됨
- 회복 이후 1개월 동안 헌혈 금지
- 남성의 경우 회복 후 6개월 동안 피임기구 사용

